



Exercice 1

ABC est un triangle, on pose $BC = a$, $AC = b$, et $AB = c$; A' , B' , C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$; G l'isobarycentre du triangle ABC.

1) Montrer que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 - \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$

2) En calculant de deux façons différentes : $(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC})^2$, établir que

$$\vec{MA} \cdot \vec{MA'} + \vec{MB} \cdot \vec{MB'} = 3MG^2 - \frac{1}{6}(a^2 + b^2 + c^2)$$

3) On considère les points communs aux cercles de diamètres $[AA']$ et $[BC]$ montrer que lorsqu'ils existent ; ils appartiennent à un cercle de centre G dont on donnera le rayon en fonction de a , b et c .

Exercice 2

ABC est un triangle et on désigne par G son centre de gravité. Soit φ et f les applications définies par :

$$\varphi : P \rightarrow IR$$

$$f : P \rightarrow IR$$

$$M \mapsto \varphi(M) = \vec{MA} \cdot \vec{MB} + \vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA}$$

$$M \mapsto f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$$

1) Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$\varphi(M) = 3MG^2 + \varphi(G) \quad \text{et} \quad \varphi(G) = -\frac{1}{2}f(G)$$

2) Calculer $f(G)$ en fonction de AB , AC et BC et en déduire l'expression de $\varphi(M)$ en fonction de MG , AB , AC et BC .

3) Dans le cas particulier où le triangle est équilatéral de côté a , déterminer l'ensemble des points M

tels que : $\frac{a^2}{4} \leq \varphi(M) \leq \frac{a^2}{2}$.

Exercice 3 On considère dans un plan P un triangle équilatéral ABC de côté a ($a \in IR^*_+$)

1. Construire le barycentre D du système $\{(A;2), (B;-2), (C;-1)\}$.

2. a. Déterminer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ en fonction de a .

b. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles et que le triangle BCD est rectangle en B.

3. Calculer les distances CD , BD et AD en fonction de a .

4. Pour tout point M du plan on pose $f(M) = 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2$ et on désigne par (F)

L'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = 0$.

a. Vérifier que C appartient à (F) .

b. Exprimer $f(M)$ en fonction de MD et de a .

c. Déterminer et construire (F) .

5. Pour tout point M du plan, on pose $g(M) = 2\vec{MC} \cdot \vec{DB} + a^2$.

a. Déterminer l'ensemble (G) des points M du plan tels que $g(M) = a^2$.

b. Soit I le point d'intersection autre que C des ensembles (F) et (G) .

Montrer que le triangle CDI est équilatéral.

Exercice 4 On donne un triangle ABC rectangle en A de centre de gravité G et A' le milieu de $[BC]$. On pose $BC = a$.

a) Exprimer $4\vec{GA} \cdot \vec{AA'}$ en fonction de a .

b) Exprimer $GB^2 + GC^2$ en fonction de a .

c) En déduire que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{2}{3}a^2$

d) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{3}{4}a^2$

Exercice 5

ABC est un triangle dont les angles sont aigus. A' , B' et C' les projetés orthogonaux respectifs de A sur $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

1) Montrer que



- a) A' est Barycentre de $\left\{ \left(B, \tan \hat{B} \right); \left(C, \tan \hat{C} \right) \right\}$
 b) B' est Barycentre de $\left\{ \left(A, \tan \hat{A} \right); \left(C, \tan \hat{C} \right) \right\}$
 c) C' est Barycentre de $\left\{ \left(B, \tan \hat{B} \right); \left(A, \tan \hat{A} \right) \right\}$

2) Soit H l'orthocentre du triangle ABC et le vecteur \vec{V} défini par

$$\vec{V} = \tan \hat{A} \cdot \vec{HA} + \tan \hat{B} \cdot \vec{HB} + \tan \hat{C} \cdot \vec{HC}$$

- a) Montrer que $\vec{V} \perp \vec{BC}$ et $\vec{V} \perp \vec{AB}$.
 b) Que peut on déduire du point H ?

Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- 1) Démontrer que : $(AB, AC) + (CA, CB) + (BC, BA) = \pi [2\pi]$.
 2) On suppose que ABC est isocèle en A ; déterminer (CA, CB) si $(AB, AC) = - [2\pi]$.

Exercice 7: Soit ABC un triangle rectangle en A, O le milieu de [BC] et E celui de [AB].

On pose $(CA, CB) = \alpha [2\pi]$.

- 1) Montrer que $(OE, OB) = (OA, OE) = \alpha [2\pi]$.
 2) En déduire que $(OA, OB) = 2\alpha [2\pi]$.

Exercice 8: A et B sont deux points du plan ; Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan vérifiant :

- 1) $(\vec{MA}; \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ 4) $(\vec{MA}; \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ 6) $(\vec{MB}; \vec{MA}) = 0 [2\pi]$
 2) $(\vec{MA}; \vec{MB}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ 5) $\left| (\vec{MA}; \vec{MB}) \right| = \frac{\pi}{6} [2\pi]$ 7) $(\vec{MB}; \vec{MA}) = \pi [2\pi]$

Exercice 9 : Soit (δ) et (ζ) deux cercles sécants en deux points A et B . On choisit un point C sur (δ) et un point D sur (ζ) , ces points étant distincts de A et B .Un point P décrit le cercle (δ) .La droite (PA) coupe le cercle (ζ) en un point Q ; lorsque P est en A ,on considère que la droite (PA) est la tangente en A à (δ)

1. Montrer que $(\vec{BC}; \vec{BD}) = (\vec{PC}; \vec{QD})(\pi)$.En déduire que (PC) et (QD) sont sécantes en un point R si et seulement si C, B et D ne sont pas alignés.

2. On suppose B, C et D non alignés. Montrer que $(\vec{RC}; \vec{RD}) = (\vec{BC}; \vec{BD})(\pi)$

En déduire l'ensemble décrit par R quand P décrit (δ) .

Exercice 10 ABC est un triangle ;H le projeté orthogonal de A sur (BC) ; P et Q sont les projetés orthogonaux de H respectivement sur les droites (AB) et (AC).

- 1) Montrer que : $(\vec{HA}; \vec{HB}) = (\vec{CQ}; \vec{CB})[\pi]$ puis que $(\vec{HA}; \vec{HQ}) = (\vec{PA}; \vec{PQ})[\pi]$
 2) Déduisez en que les points B ;P ;C ;Q sont cocycliques .

Exercice 11 ABC est un triangle tel que B et C soient fixes et A variable dans le plan vérifiant :

$$(\vec{BC}; \vec{BA}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) = \frac{\pi}{3} [\pi]$$

- 1) Quel est l'ensemble des points A ?
 2) Soit B' le symétrique de B par rapport à (AC) et C' le symétrique de C par rapport à (AB). Démontrer que : (BB') et (CC') sont sécantes.
 3) On note D le point d'intersection de (BB') et (CC'). A quelle figure le point D appartient-il ?

Exercice 12 Soit ABC un triangle, F le point diamétralement opposé à A sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Pour tout point M la droite passant par M et orthogonal à (MF) coupe (AB) en P et (AC) en Q.

- 1) Montrer que : $(\vec{FP}; \vec{FQ}) + (\vec{MB}; \vec{MC}) = (\vec{AB}; \vec{AC})[\pi]$
 2) Déterminer l'ensemble des points M tels que : F, P et Q soient alignés.
 3) Déterminer l'ensemble des points M tels que : $(\vec{FP}; \vec{FQ}) = \alpha[\pi]$

Exercice 13. ABC est un triangle et M un point qui se projette orthogonalement sur (BC), (CA) et (AB) respectivement en P, Q et R.



- 1) Montrer que : $(MA, MR) = (CA, QR) [\pi]$.
- 2) Montrer que : $(MB, MR) = (CB, PR) [\pi]$.
- 3) En déduire que : $(MA, MB) = (CA, CB) + (PR, QR) [\pi]$.
- 4) Démontrer que P, Q et R sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit au triangle ABC.
(La droite contenant les points P, Q et R est une droite de **Simson** de M relativement à ABC).



Isométries du plan et Applications affines

Exercice 1

Soit ABC un triangle équilatéral tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ on appelle O le centre de gravité du triangle. Les points I ; J ; K sont tels que : $\overrightarrow{AI} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{5}{3}\overrightarrow{CA}$

- 1) Déterminer deux nombres réels a et b tels que I soit barycentre de (A ;a) et (B ;b).
- 2) En utilisant la rotation de centre O qui transforme A en B ; démontrer que O est le centre de gravité du triangle IJK.

Exercice 2

ABCD est un carré de centre de O tel que $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur \overrightarrow{BC} . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de rot.

Exercice 3

Dans le plan orienté ; on considère un triangle équilatéral ABC tel que une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. On appelle (Γ) le cercle circonscrit au triangle ABC. La médiatrice de [BC] coupe (Γ) en A et D, on appelle A' le point d'intersection des droites (BD) et (AC).

- 1) Démontrer que A' est le symétrique de A par rapport à C.
- 2) On désigne par $S_{(BD)} \circ S_{(CD)}$; $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$ les symétries orthogonales par rapport à (BD) ; (CD) ; (CA) ; (AB) respectivement.
- 3) Quelle est la nature des applications suivantes : $S_{(BD)} \circ S_{(CD)}$; $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$? on précisera les éléments caractéristiques.
- 4) Soit (Δ) la droite parallèle à (DC) menée par A et $S_{(\Delta)}$ la symétrie orthogonale par rapport à (Δ) .
Démontrer que : $S_{(BD)} \circ S_{(CD)} = S_{(DC)} \circ S_{(DA)}$ et $S_{(CA)} \circ S_{(AB)} = S_{(DA)} \circ S_{(\Delta)}$
- 5) Retrouver les résultats du 1) en utilisant l'application t définie par : $t = S_{(BD)} \circ S_{(CD)} \circ S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$ que l'on caractérisera.

Exercice 4

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. on appelle R la rotation de centre A qui transforme B en C et T la translation de vecteur \overrightarrow{AB} ; on note I le milieu de [BC]

- 1) Construire le point J = R(I).
- 2) On pose $F_1 = R \circ T$ et $F_2 = T \circ R$
Déterminer $F_1(J)$ et $F_2(I)$ puis en déduire la nature et les éléments caractéristiques de F_1 et F_2 .
- 3) Soit M un point du plan $M_1 = F_1(M)$ et $M_2 = F_2(M)$; Quelle est la nature du triangle BCM₁M₂ ?

Exercice 5

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; i; j)$ et A (2 ;0) , B(2 ;2) , C(0 ;D)

S_1 et S_2 sont les orthogonales par rapport à (AC) et (OA) et la translation de vecteur \overrightarrow{OC}
Reconnaitre $S_1 \circ S_2$; puis $T \circ S_2 \circ S_1$

Exercice 6

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; i; j)$ et I (0 ;1) , J(1 ;0)

R_1 et R_2 sont les rotations de centre respectifs I et J d'angle $\frac{\pi}{2}$ et T la translation de vecteur \overrightarrow{IJ}

Reconnaitre $S = R_1 \circ T \circ R_2$



Exercice 7

Soit ABC un triangle tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $AB < AC$. On appelle (Ψ) le cercle circonscrit au triangle ABC et le point O son centre. Soit E le milieu de [BC] et P le point [AC] tel que $AB = CP$. La droite (OE) coupe (Ψ) en I et J tel que J et A soient sur le même arc du (Ψ) .

1) a) Faire une figure.

b) Quel est l'ensemble des points M du plan (P) tels que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$?

c) Quel est l'ensemble des points M de (P) tels que : $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ et $MB < MC$?

2) a) Justifier qu'il existe une unique rotation R tel que $R(A) = P$ et $R(B) = C$. Déterminer son centre.

b) Démontrer que son centre est un point de (Ψ) que l'on précisera

c) Quelle est la nature du triangle JAP ?

3) Déterminer l'image de B par RoS_B où S_B est la symétrie centrale de centre B. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de RoS_B .

Exercice 8

On considère dans le plan orienté (P) ; deux points A et B. Soit :

R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et R_B la rotation de centre B et d'angle $\frac{2\pi}{3}$

Pour tout point M du plan (P) ; on pose $M' = R_A(M)$ et $M'' = R_B(M)$.

1) De l'étude de $R_B \circ (R_A)^{-1}$ déduisez en que pour tout point M du plan (P) le milieu du segment $[M'M'']$ est un point fixe J dont on démontrera qu'il appartient au cercle de diamètre [AB].

2) Le but du problème est de déterminer l'ensemble des M de (P) pour les quels M ; M' ; M'' sont alignés.

a) Pour tout point M distinct de A et B, démontrer que : $(\overrightarrow{MM'}; \overrightarrow{MM''}) = (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) - \frac{\pi}{2} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$.

b) Déduisez en l'ensemble des points M du plan (P) pour les quels M ; M' ; M'' sont alignés. *Indication* : On pourra calculer dans le triangle BMM'' : $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MM''}) + (\overrightarrow{M''M}; \overrightarrow{M''B})$.

Exercice 9

On considère trois points non alignés A, B et C. Pour tout réel α on définit l'application f_α du plan dans lui-même qui à tout point M associe le point M' tel que : $MM' = 2\alpha MA - \alpha MB - MC$.

1) Montrer que f_1 est une translation que l'on précisera.

2) a) On suppose que $\alpha \neq 1$. Montrer que f_α admet un unique point invariant G_α et que : $CG_\alpha = k(AB + AC)$, où k est un réel dépendant de α que l'on précisera.

b) Déterminer l'ensemble des points G_α lorsque $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

On suppose toujours que $\alpha \neq 1$. Exprimer $G_\alpha M'$ en fonction de $G_\alpha M$ puis en déduire la nature de f_α suivant les valeurs de α . On précisera ses éléments caractéristiques

Exercice 10

Soit A, B, C trois points non alignés du plan et C' le point défini par $CC' = AB$; on désigne par f l'application affine du plan définie par $f(A) = A$; $f(B) = B$ et $f(C) = C'$

1) Montrer que f est une application bijective. Déterminer l'ensemble des points invariant par f. f est-elle une isométrie ? Montrer que les droites parallèles à (AB) sont globalement invariantes par f

2) Le point G est l'isobarycentre de A, B, C ; montrer que $G' = f(G)$ appartient à (BC)

3) M est un point du plan. Donner une construction géométrique de $M' = f(M)$.

Exercice 11



1) O est un point du plan et u un vecteur non nul, soit t la translation de vecteur u h est l'homothétie de centre O et de rapport k . Quelle est la nature de l'application $h \circ t$?
Préciser les éléments servant à la définir

2) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; i; j)$. Soit $M(x, y)$ et $M'(x', y')$ l'application S définie par

$$\begin{cases} x' = x + 2y - 2 \\ y' = -y + 2 \end{cases}$$

montrer que S est une symétrie, préciser ses éléments caractéristiques

Exercice 12

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; i; j)$ Soit le vecteur $\vec{u} \left(-\frac{3}{2}; 2 \right)$ et f l'application du plan dans

lui-même qui à tout point M associe le point M' telle que : $\vec{OM}' = (\vec{u} \cdot \vec{OM}) \vec{i} + (\vec{j} \cdot \vec{OM}) \vec{u}$

- 1) Donner l'expression analytique de f . En déduire que f est une application affine
- 2) Déterminer deux points A et B tel que $f(A) = A$ et $f(B) = -4OB$; en déduire que f est une affinité orthogonale dont on précisera l'axe et le rapport.
- 3) Exprimer analytiquement f dans le repère $(O; OA; OB)$

Exercice 13

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; i; j)$ et f l'application du plan dans lui-même qui à tout point

M associe le point M' telle que :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{13}(5x - 12y + 24) \\ y' = \frac{1}{13}(-12x - 5y + 36) \end{cases}$$

- 1) Démontrer que $f \circ f = \text{Id}$
- 2) Démontrer que l'ensemble des points invariant est une droite (D) que l'on déterminera.
- 3) Soit M un point du plan et M' son image par f
 - a) Démontrer que le milieu de $[MM']$ appartient à (D)
 - b) Démontrer que le vecteur \vec{MM}' a une direction fixe orthogonale à celle de (D)
 - c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .